



吉福尼安全用药须知

(请仔细阅读本须知, 按本须知或在医生指导下用药)

【药品商品名】

Giefoni, 品名: 吉福尼, 通用名: Gefitinib。

【适应症】

吉福尼是一种络氨酸激酶抑制剂 (TKI), 用于一线治疗转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 表皮生长因子受体 (EGFR) exon 19 缺失或 exon 21 (L858R) 替换突变类型的患者。

用药限制: 对于除 exon 19 缺失或 exon 21 (L858R) 替换突变外的其他 EGFR 突变, 吉福尼的安全性和有效性尚未确定。

【剂量和给药方法】

1、给药方法

- 推荐剂量为 250mg, 口服, 每日一次; 不与食物同服或与食物同服均可。

2、剂型规格

- 片剂, 250mg。

3、禁忌症: 无。

【警告和注意事项】

- **间质性肺病 (ILD)**: 服用吉福尼期间可能出现 ILD. 呼吸系统症状恶化需暂停服药。如果确认 ILD 则终止服药。

- **肝毒性**: 定期接受肝功能检测。出现 2 级或更高级别的 ALT 和/或 AST 升高需暂停服药。若出现严重的肝损伤需停止服药。

- **胃肠道穿孔**: 若出现胃肠道穿孔则停止服药。

- **腹泻**: 出现3级或更高级别的腹泻需暂停服药。

- **眼部疾病包括角膜炎**: 出现严重或恶化的眼部疾病包括角膜炎的征兆和症状需暂停服药, 出现长期溃疡性角膜炎需停止服药。

- **牛皮癣和脱落性皮肤病**: 出现3级及更高级别的皮肤反应或脱皮情况需暂停用药。

- **胚胎毒性**: 可能导致胎儿损伤。建议采取有效的避孕措施避免潜在的胎儿风险。



【不良反应】

大于 20%并且超过安慰剂组的最常见的药物不良反应是皮肤反应和腹泻。

【储存方法】

遮光、阴凉干燥处。