



## 索拉非尼安全用药须知

（请仔细阅读本须知，按本须知或在医生指导下用药）

### 【药品商品名】

Soranni，品名：索拉非尼，通用名：Sorafenib。

### 【适应症】

包括：不可切除的肝细胞癌、晚期肾细胞癌、对放射性碘治疗难治的局部复发或转移，以及进展的分化型甲状腺癌。

### 【剂量和给药方法】

#### 1、给药方法

- 400mg（2片）口服，每天2次，空腹给药。
- 为处理怀疑不良药物反应可能需要中断治疗和/或减低剂量。剂量可减低至400mg每天1次或至400mg，每隔天1次。

#### 2、剂型规格

- 片剂，200mg。

#### 3、禁忌症

- 已知对索拉非尼或药物其它任何组分过敏者禁用索拉非尼。
- 在鳞状细胞肺癌患者中，禁忌索拉非尼与卡铂和紫杉醇联用。

### 【警告和注意事项】

- **心肌缺血和/或梗死**：考虑暂时或永久终止索拉非尼。
- **出血**：如出血需要医学干预，考虑终止索拉非尼。
- **高血压**：治疗前6周，每周定期监测血压。后续治疗也应定期监测。
- **皮肤毒性**：中断和/或降低剂量。出现重度或持续性皮肤毒性反应，或怀疑斯蒂文斯-约翰综合征和中毒性表皮坏死松解症时停止服药。
- **胃肠道穿孔**：停止服用索拉非尼。
- **QT间期延长**：室性心律失常高风险患者定期监测心电图和电解质水平。
- **药物诱发肝毒性**：定期监测肝功能；若出现无法解释的转氨酶升高，则停止服药。
- **胚胎毒性**：建议育龄期妇女服药时避免怀孕。
- **分化型甲状腺癌（DTC）中促甲状腺素（TSH）损伤**：每月监测一次TSH，



在甲状腺癌患者中适用甲状腺替代治疗。

**【不良反应】**

与索拉非尼相关的最常见不良反应（ $\geq 20\%$ ）：腹泻、疲劳、感染、秃头、手足皮肤反应、皮疹、体重减轻、厌食、恶心、胃肠道疼痛及腹痛、高血压和出血。

**【储存方法】**

遮光、阴凉干燥处。